

## INFORMACJA DLA PACJENTA BADANIE TRUS I BIOPSJA PROSTATY

**Ultrasonografia przezodbytnicza** (ang. **TRUS** -Transrectal Ultrasound) jest metodą badania pozwalającą na dokładną ocenę gruczołu krokowego (prostaty).


Obraz gruczołu uzyskuje się poprzez wprowadzenie głowicy ultrasonograficznej do odbytnicy. Badanie odbywa się w ułożeniu na boku, trwa około 15 minut, pacjent odczuwa je podobnie do badania palcem przez urologa.

### Wskazania do badania TRUS:

- dokładne ustalenie wielkości prostaty
- ocena zmian zapalnych
- poszukiwanie i ocena ognisk nowotworów

U pacjentów podejrzanych o raka prostaty badanie TRUS musi być uzupełnione **BIOPSJĄ**.

**Biopsja** polega na pobraniu wycinków (fragmentu tkanki) z prostaty pod kontrolą głowicy ultrasonograficznej wprowadzonej do odbytnicy. Pobrane wycinki są oceniane przez lekarza patologa pod mikroskopem. Biopsja jest wykonywana igłą w znieczuleniu miejscowym, pacjent odczuwa kilka ukłuć.



### Zalecenia przed biopsją prostaty

- Należy odstawić leki obniżające krzepliwość krwi - po konsultacji z kardiologiem/internistą  
Acenokumarol, Sintrom, Xarelto, Eliquis – na 48 h przed biopsją,  
Pradaxa - na 72 h przed biopsją,  
Warfin – na 5 dni przed biopsją,  
Cpidogrel, Plavix, Areplex, Ticlopidyna, Brilique - na 7 dni przed biopsją,  
Acard, Aspiryna, Polocard, Polopiryne - na 7 dni przed biopsją,
- Od dnia poprzedzającego biopsję zacząć przyjmować antybiotyk – według zaleceń urologa kierującego na badanie (również rano w dniu biopsji)
- Na badanie nie należy zgłaszać się na czczo, należy zjeść przewidziane posiłki,
- Wskazane jest wypróżnienie w dniu badania (przed biopsją)
- Proszę przynieść ze sobą wynik badania PSA oraz badania obrazowe (CT, MR)
- Proszę podać nazwę odstawionych leków oraz nazwę antybiotyku.

### Po biopsji

- Należy kontynuować przyjmowanie antybiotyku
- Jeszcze przez 3 dni nie przyjmować leków obniżających krzepliwość krwi
- Unikać wysiłków fizycznych i aktywności seksualnej, pić więcej płynów
- Przez kilka dni po biopsji może być widoczna krew lub skrzepy w moczu, stolcu i nasieniu.

**Jeżeli krwawienie jest bardzo obfite lub wystąpi gorączka powyżej 38 st. należy zgłosić się na ostry dyżur urologiczny.**

**POWYŻSZA INFORMACJA JEST MATERIAŁEM EDUKACYJNYM A NIE PORADĄ LEKARSKĄ.**  
Szczegółowych informacji na temat badania udzieli lekarz je wykonujący.